

اگر نوزادی این سوابق را دارد بررسی
شنوایی وی الزامی است:


مراقب سلامت گوش و شنوایی خود
باشیم:

۱۳ اسفند، روز جهانی شنوایی
اقدام برای کم شنوایی
سرمایه گذاری پر منفعت

سابقه خانوادگی کم شنوایی دائمی از دوران
کودکی، مشکلات شنوایی، گفتار، زبان یا
تاخیر رشد

بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادی
بیش از ۵ روز که می تواند شامل تهویه
کمکی با چادر اکسیژن، استفاده از داروهای
اتوتوکسیک (جنتامایسین و توبومایسین) یا
دیورتیک های حلقوی (فورسماید و لازیکس)،
ابتلا به هایپر بیلی روبینمیا همراه با تعویض
خون.

عفونت های داخل رحمی: سیتومگالوویروس،
هرپس، سرخجه، سیفلیس، توکسوپلاسمو



وارد نکردن جسم خارجی به گوش، پرهیز از
تولید سرو صدای بلند (بوق زدن و...)، استفاده
از گوشی محافظ در مکان های پرسر و صدا،
اقدام برای درمان بیماری هایی که می تواند
منجر به کم شنوایی شود، قورت ندادن
عطسه، باز کردن دهان در صورت تغییر فشار
هوا



برخورداری از سلامت حس شنوایی
اساس رشد طبیعی گفتار و زبان



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

بیمارستان مرکز طبی کودکان

**اگر کم شنوایی کودکی با انجام ارزیابی-
های شنوایی تایید شد:**

اقدامات توانبخشی شامل تجویز سمعک،
شرکت در کلاس‌های تربیت شنوایی و
گفتاردرمانی الزامی است.



**آزمون های شنوایی از نوزادی تا
کهنسالی قابل انجام است.**



کلینیک شنوایی شناسی

مرکز طبی کودکان-اسفند ۹۵

**اگر کودکی به این بیماری ها دچار شود
بررسی شنوایی او الزامی است:**

-عفونت گوش، تورم لوزه، مننژیت، تشنج،
ضربه به سر به ویژه قاعده جمجمه و
استخوان گیجگاهی که منجر به بستری در
بیمارستان شود

**اگر کودکی این مشکلات را دارد بررسی
شنوایی وی الزامی است:**

تاخیر در مراحل رشد جسمی (گردن گرفتن،
نشستن، ایستادن و راه رفتن)

کم توجهی به صدا های اطراف و صحبت
شما، بیقراری و بیش فعالی

تاخیر در گفتار، افت تحصیلی



**اگر کودکی این علائم را دارد بررسی
شنوایی وی الزامی است:**

-بدفرمی‌های جمجمه‌ای - صورتی شامل
لاله گوش، کانال گوش خارجی، منگوله
گوش، سوراخ ریز اطراف لاله، ناهنجاری های
استخوان گیجگاهی

-موی جلوپیشانی سفید

-سندرم های همراه با کم شنوایی از بدو تولد
و یا ظهور تاخیری و پیشرونده مانند آشر،
نوروفیبروماتوزیس، استئوپتروزیس، واردنبرگ،
پندرد، آلپرت، مولتی پلی ساکاریدوزیس،
ایکتیوزیس، داون

-اختلالات نورودژنراتیو مانند سندرم هانتز،
یا نوروپاتی های حسی- حرکتی مانند
آتاکسی فردریش

-کشت مثبت عفونت های همراه با کم
شنوایی، به خصوص مننژیت باکتریایی و
ویروسی (هرپس و وریسلا)