



چگونه می توان از ابتلا به آن جلوگیری کرد؟

- ۱- محافظت از مفصل هنگام فعالیت های سنگین
- ۲- درمان عفونت های نقاط مختلف بدن

عوارض ابتلا به آرتریت سپتیک چیست؟ متاسفانه

تشخیص اشتباهی به عنوان نقرس یا بیماری عفونی دیگر که باعث به تاخیر افتادن استفاده از آنتی بیوتیک شود آسیب یا معلولیت دائمی مفصل و عفونت خون خواهد شد!

علل زمینه ساز ابتلا کودک به بیماری چیست؟

- ۱- بروز یک بیماری که مقاومت بدن را کم کرده
- ۲- اعمال جراحی روی مفصل
- ۳- وجود مفصل مصنوعی
- ۴- تزریق داخل مفصل
- ۵- بهداشت پائین
- ۶- دیابت

آرتریت سپتیک به معنی التهاب مفصل ناشی از

عفونت است. در این بیماری هر مفصلی می تواند درگیر شود اما مفاصل بزرگتر مثل ران یا آن دسته از مفاصلی که در معرض ضربه قرار دارند مثل زانو یا مفاصل دست بیشتر در معرض ابتلا به عفونت هستند

علائم بیماری چیست؟ شامل تب- تورم و قرمزی-

درد (اغلب درد های ضربان دار) هنگام لمس مفاصل که گاهی به مفاصل دیگر نیز انتشار می یابد. همچنین کودک ممکن است از تکان دادن مفصل یا اندام گرفتار خودداری کرده و آن را در یک وضعیت خاص بطور ثابت نگه دارد..مثلا یکی از پاهای خود را بالا نگه داشته و از زمین گذاشتن آن امتناع کند.

علت ابتلا کودک به بیماری چیست؟ وارد شدن

میکروب به مفصل، از طریق یک زخم در آن محل یا ورود یک شیئی نوک تیز الوده بداخل مفصل مانند یک سوزن و یا انتشار عفونت از طریق خون از یک کانون عفونی در نقطه ای دیگر در بدن





دانشگاه علوم پزشکی تهران


مرکز طبی کودکان

قطب علمی اطفال کشور

راهنمای والدین در مورد بیماری های عفونی

آرتریت سپتیک

کد آموزشی: ۱-۴۵



©MMG 2000

تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب،

جنب بیمارستان امام خمینی (ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان. تلفن: ۰۲۱۶۱۴۷۵

وب سایت آموزش به بیمار مرکز طبی <http://chmc.tums.ac.ir>

آرتریت سپتیک چگونه درمان می شود؟

- ۱- مصرف آنتی بیوتیک
- ۲- مسکن جهت کاهش درد
- ۳- استفاده از آتل یا گچ برای استراحت کامل مفصل
- ۴- جراحی برای تخلیه مایع عفونی شده یا خارج کردن جسم خارجی وارده شده به مفصل گاهی ضروری میباشد.

Septic Arthritis

چند توصیه مهم به والدین کودک بیمار:

- ✓ پیگیری و کشت های متوالی از مفصل
- ✓ کاهش درد بیمار با مصرف مسکن
- ✓ تمرینات مخصوص جهت بازگرداندن حرکت مفصل پس از شروع درمان
- ✓ توصیه به مصرف به موقع آنتی بیوتیک و تکمیل کامل دوره درمان حتی زمانیکه همه علائم در ظاهر بهبود پیدا کرده اند.
- ✓ مراقبت از آتل یا گچ بیمار
- ✓ رژیم غذایی سرشار از ویتامین C و پروتئین فراهم آورده و کودک را به مصرف مایعات کافی تشویق نمایم.

