

بیوپسی کبد:

بیوپسی کبد همان نمونه برداری از کبد است که در آن از بافت کبد نمونه برداشته و توسط میکروسکوپ بررسی شده تا بیماریها و ناراحتیهای کبد تشخیص داده شود. به روشهای مختلفی این کار انجام می شود.



آمادگیهای لازم برای نمونه برداری از کبد:

- ۱- ارسال نمونه آزمایشگاهی
- ۲- گرفتن یک رگ مطمئن در صورت لزوم
- ۳- ناشتا بودن بیمار ۶ ساعت قبل از انجام بیوپسی
- ۴- اطلاع داشتن از داروهای مصرفی بیمار مثل آسپرین یا بروفن که نباید چند ساعت قبل از بیوپسی استفاده شود.
- ۵- در بیماران دیابتی عدم تزریق انسولین برای جلوگیری از افت قند خون (بهتر است این بیماران در ساعتی اولیه بیوپسی شوند)
- ۶- قبل از انجام این پروسیجر توضیح کامل به بیمار یا همراه بیمار در صورت اطفال بودن

۷- گرفتن رضایت از ولی بیمار یا خود بیمار در صورت بالغ بودن

۸- کنترل علائم حیاتی بیمار قبل از انجام این اقدام و در صورتی که بیمار مشکل قلبی دارد مانیتورینگ قلبی برای ضربان و پایش مداوم

نمونه برداری از پوست: که شایعترین نوع نمونه برداری است که داشتن آرامش از نکات مهم این عمل می باشد این اقدام بیشتر از ۱۵ دقیقه طول نمی کشد

عوارض ناشی از بیوپسی کبد

- درد
- خونریزی
- التهاب صفاق: به علت نفوذ مایع و عفونت احتمالی شکم

اقدامات بعد از نمونه برداری از کبد :

- * استراحت تقریباً ۴ ساعت بعد از بیوپسی (عدم تحرک)
- * پایش منظم، نبض، تنفس، درجه حرارت و فشار خون
- * کنترل بیمار از نظر درد و خونریزی
- * گذاشتن کیسه شن بر روی کبد به خصوص در روش پوستی
- * تهوع و استفراغ و سرگیجه از علائم بعد از بیوپسی می باشد.



دانشگاه علوم پزشکی تهران

(مرکز طبی کودکان)

قطب علمی اطفال کشور

CHMC/N/B/۱۴۴/RW-۲



بیوپسی کبد

* دادن آموزش های ضمن ترخیص برای جلوگیری از

انجام اعمال برخی سنگین مثل کار سنگین یا برداشتن

وسایل سنگین تا چند روز

* بعد از ۴ تا ۶ ساعت دادن یک رژیم مایع نرم

* تزریق سرم در صورت داشتن دستور پزشک

* اگر بعد از ۳ روز از انجام بیوپسی درد با توجه به

خوردن مسکن کاهش پیدا نکرد و در صورت ادامه مراجعه به

پزشک

مرکز آموزشی درمانی پژوهشی طبی کودکان:

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، جنب

بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان

وب سایت بیمارستان: آموزش به بیمار

<http://chmc.tums.ac.ir>