



## شربت کلرال

داروی کلرال هیدرات بصورت کوتاه مدت برای آرام نمودن و خواباندن کودک، جهت بررسی دقیق تر و بهتر دریچه ها و عروق قلبی در اکو کاردیوگرافی استفاده می شود.

کودک را در وضعیت نیمه نشسته قرار دهید و بصورت خیلی آرام از کناردهان، سرنگ را وارد نموده، دارو را به اندازه ۱ سی سی ۱ سی سی به کودک بدهید و بعد از دادن دارو با توجه به سن او شیر یا آب میوه دهید.

مقدار مصرف دارو بر اساس وزن کودک محاسبه می شود. به ازای هر کیلوگرم وزن کودک ۱ سی سی داده می شود. به عنوان مثال، کودکی با وزن ۱۰ کیلوگرم نیاز به ۱۰ سی سی شربت کلرال دارد.

کودک بعد از بیدار شدن حالت خواب آلودگی و گیجی دارد که والدین می بایست ضمن دادن مایعات در منزل، مراقب افتادن احتمالی و صدمه به سر کودک باشند.

مصرف این دارو منحصراً در بیمارستان و در حضور کادر پزشکی متخصص و همراه با کنترل علائم تنفسی است.

شروع اثر: ۳۰-۶ دقیقه

دوام اثر: ۴-۸ ساعت

نیمه عمر: ۱ ساعت

دفع: عمدتاً دفع ادراری داشته و اندکی از طریق مدفوع نیز دفع می شود.

## عوارض جانبی کلرال هیدراته

تحریک معده، اتساع شکمی، خواب آلودگی، سبکی سر، عدم تعادل، سردرد، بی قراری  
توهم، کابوس شبانه، راشهای پوستی  
در مصرف بیش از حد دارو: استفراغ، نامنظمی ضربان قلب، آسیب کبدی و کلیوی دیده می شود.

## هشدارها

- ۱- این دارو در بیماران با اختلال کبدی یا کلیوی شدید نباید تجویز شود.
  - ۲- در صورت وجود مشکلات گوارشی، بهتر است از مصرف خوراکی آن اجتناب گردد.
  - ۳- همانند سایر آرام بخش ها، این دارو در بیماران با مشکلات تنفسی باید با احتیاط داده شود.
- درمانگاه مرکز طبی کودکان