

واکسن ۱ سالگی : (MMR)

افرادی که با صلاح‌دید پزشک معالج نسبت

۶: عفونت فعال همراه با تب یا بدون

به واکسیناسیون اقدام کنند:

تب.

۱: ابتلاء به بیماریهای نقص سیستم

ایمنی.

مادر گرامی شما جهت تزریق واکسن یک سالگی کودک خود به این مرکز مراجعه کرده اید.

۷: سل فعال درمان نشده.


۲: افراد حامله.



۳: کسانی که شیمی درمانی یا پرتودرمانی می کنند.

۴: حساسیت به ژلاتین یا آنتی بیوتیک نئومایسین.

۵: بیماری حاد تنفسی .



و به ندرت منثیت و مننگوآنسفالیت گذرا

توجه:

۱- تزریق غیر عمد **MMR** به مادر

حامله نیاز به سقط نمی باشد.

۲- تماس زن حامله با کسی که واکسن

سرخجه دریافت کرده مانع ندارد.

عارض واکسن:

کسالت- گلودرد- سرفه- التهاب بینی- ورم

بدون درد بناگوش - ورم بیضه ها- تهوع-

استفراغ- اسهال و تب و بثورات

پوستی(۱-۲ هفته پس از تزریق واکسن)



دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز طبی کودکان
قطب علمی

CHMC/N/B/۱۳۰ RW-۲



مواردی که شما باید رعایت کنید:

استراحت در منزل – دادن استامینوفن در

صورت تب یا درد.

آدرس : تهران، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲_ مرکز طبی کودکان

تلفن : ۰۲۱ ۶۱۴۷۲۳۲۰

وب سایت : chmc.tums.ac.ir

ایمیل : chmc@tums.ac.ir

واکسن ۱ سالگی