

واکسن ۱۸ ماهگی (MMR - ثلاث- فلج اطفال)



کسانی که نباید واکسن MMR را تزریق کنند:

- ۱: ابتلاء به بیماریهای نقص سیستم ایمنی.
- ۲: افراد حامله.
- ۳: کسانی که شیمی درمانی یا پرتودرمانی می کنند.
- ۴: حساسیت به تخم مرغ.
- ۵: حساسیت به ژلاتین یا آنتی بیوتیک نئومايسين.
- ۶: بیماری حاد تنفسی.

- ۷: عفونت فعال و نیمه فعال همراه با تب یا بدون تب.
- ۸: سل فعال درمان نشده.

عوارض واکسن MMR:

کسالت - گلودرد - سرفه - التهاب بینی - ورم بدون درد
بناگوش - ورم بیضه ها - تهوع - استفراغ - اسهال و تب و
بثورات پوستی (۲-۱ هفته پس از تزریق واکسن).
و به ندرت مننژیت و مننگوآنسفالیت گذرا و خوش
خیم.

مواردی که شما باید رعایت کنید:

استراحت در منزل - دادن استامینوفن در صورت تب
یا درد. (دو برابر وزن کودک قطره استامینوفن دهید.
اگر کودک شما ۱۱ کیلو است، ۲۲ قطره استامینوفن
دهید).

توجه:

- ۱- تزریق غیر عمد MMR به مادر حامله نیاز به
سقط نمی باشد.
- ۲- تماس زن حامله با کسی که واکسن سرخجه
دریافت کرده مانعی ندارد.



نکاتی که لازم است پس از انجام واکسن فلج اطفال توجه شود:

- ۱: دادن شیر یا آب به کودک قبل و پس از خوردن
قطره مانعی ندارد.
- ۲: دستهای خود را پس از هر بار تعویض پوشک
بشوید.
(تا ۲ بار مدفوع)
- ۳: اسهال - سردرد - درد عضلانی از عوارض این واکسن
است که به ندرت دیده می شود.
- ۴: اگر استفراغ یا تف کردن یا بیرون ریختن قطره
قبل از ۱۰ دقیقه بود باید دادن قطره تکرار شود.



دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز طبی کودکان

قطب علمی

CHMC/N/B/131RW-2



**واکسن ۱۸
ماهگی**

۵: وجود تب تا ۴۸ ساعت پس از تزریق این واکسن طبیعی است. پس شما مادر گرامی لازم است در ۲۴ ساعت اول (روز اول) هر ۴ ساعت (حداکثر تا ۵ بار در روز در ۲۴ ساعت) و در ۲۴ ساعت بعدی (روز دوم) در صورت تب هر ۶ ساعت به فرزند خود استامینوفن دهید.

۶: اگر کودک شما تا ۷۲ ساعت پس از تزریق واکسن ثلاث تشنج کرد یا بیشتر از ۳ ساعت بیقراری مداوم داشت یا تب بیشتر از ۴۰ درجه داشت در نوبت بعدی لازم است حتماً به جای واکسن سه گانه واکسن دوگانه اطفال (DT) به کودک شما تزریق شود.

آدرس : تهران، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی (ره) ، پلاک

۶۲_مرکز طبی کودکان

تلفن : ۰۲۱ ۶۱۴۷۲۳۲۰

وب سایت : chmc.tums.ac.ir

ایمیل : chmc@tums.ac.ir

۵: استفرغ ۱۰ دقیقه پس از خوردن قطره نیازی به تکرار قطره فلج ندارد.

۶: در صورت اسهال شدید هنگام دادن قطره فلج لازم است یک ماه بعد قطره فلج تکرار شود.

۷: کودکان یا والدین تحت درمان با (داروهای سرکوب کننده ایمنی - شیمی درمانی - پرتودرمانی دریافت کورتون به مدت طولانی) و افراد سالم خانواده آنها و کودکان یا والدین مبتلا به نقص سیستم ایمنی و افراد سالم خانواده آنها و کودکان مبتلا به آترزی مری لازم است به جای دریافت نوع خوراکی قطره فلج اطفال از نوع تزریقی آن (فلج تزریقی IVP) استفاده کنند.

**نکاتی که لازم است شما پس از تزریق واکسن
ثلاث رعایت کنید عبارتند از:**

۱: بلافاصله پس از تزریق واکسن ثلاث محل تزریق را ماساژ دهید. (سمت چپ)

۲: محل را کمپرس سرد کنید. (فقط یک بار ، به مدت ۳-۴ دقیقه)

۳: قبل و یا بعد از پایان واکسیناسیون در بیمارستان به کودک خود استامینوفن دهید.

۴: پس از رسیدن به منزل محل تزریق واکسن ثلاث را کمپرس گرم کنید. تا ۴۸ ساعت