

واکسنهای ۶ سالگی

مادر عزیز شما جهت واکسیناسیون ۶ سالگی فرزند دلبندتان به این مرکز مراجعه کرده اید. واکسنهای ثلاث- فلج اطفال خوراکی در این نوبت به کودک شما تزریق می شود.



نکاتی که لازم است شما پس از تزریق واکسن ثلاث رعایت کنید عبارتند از:

۱: بلافاصله پس از تزریق واکسن ثلاث محل تزریق را ماساژدهید. (سمت چپ)

۲: محل را کمپرس سرد کنید. (فقط یک بار، به مدت ۳-۴ دقیقه)

۳: قبل و یا پس از پایان واکسیناسیون در بیمارستان به کودک خود استامینوفن دهید.

۴: پس از رسیدن به منزل محل تزریق واکسن ثلاث را کمپرس گرم کنید. (تا ۴۸ ساعت)

۵: وجود تب تا ۴۸ ساعت پس از تزریق این واکسن طبیعی است. پس شما مادر گرامی لازم است در ۲۴ ساعت اول (روز اول) هر ۴ ساعت حداکثر ۵ بار در ۲۴ ساعت و در ۲۴ ساعت بعدی (روز دوم) در صورت تب هر ۶ ساعت به فرزند خود استامینوفن دهید.

(نصف وزن کودک شربت استامینوفن بدهید).



نکاتی که لازم است پس از انجام واکسن فلج

اطفال توجه شود:

۱: خوراندن آب یا مایعات به کودک قبل و پس از خوراندن قطره مانعی ندارد.

۲: اسهال - سردرد- درد عضلانی از عوارض این واکسن است که به ندرت دیده می شود.

۳: اگر استفراغ یا تف کردن یا بیرون ریختن قطره قبل از ۱۰ دقیقه بود باید دادن قطره تکرار شود.

۴: استفراغ ۱۰ دقیقه پس از خوراندن قطره نیازی به تکرار قطره فلج ندارد.

۵: در صورت اسهال شدید هنگام دادن قطره فلج لازم است یک ماه بعد قطره فلج تکرار شود.

۶: کودکان یا والدین تحت درمان با (داروهای سرکوب کننده ایمنی - شیمی درمانی - پرتودرمانی - دریافت کورتون به مدت طولانی) و خانواده سالم آنها و کودکان یا والدین



دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز طبی کودکان
قطب علمی

CHMC/N/B/۱۳۵/RW-۲



واکسنهای ۶ سالگی

آدرس : تهران، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر
محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی (ره) ، پلاک
۶۲_ مرکز طبی کودکان

تلفن : ۰۲۱ ۶۱۴۷۲۳۳۰

وب سایت : chmc.tums.ac.ir

ایمیل : chmc@tums.ac.ir

مبتلا به نقص سیستم ایمنی و خانواده سالم آنها و کودکان
مبتلا به آترزی مری لازم است به جای دریافت نوع خوراکی
قطره فلج اطفال از نوع تزریقی آن یعنی (فلج تزریقی
IVP) استفاده کنند.

نکات مهم:

شل بودن مدفوع یا سرماخوردگی یا تب مختصر مانع از
انجام واکسیناسیون نمی شود.

ایمن سازی کودکان نارس و کم وزن و کودکان با زردی
مختصر و بیماران مبتلا به تالاسمی طبق برنامه ایمن سازی
کشوری است.

واکسیناسیون در کودکان مبتلا به سوء تغذیه به شدت توصیه
می شود، چرا که آنها را نسبت به بیماریهایی که در معرض
ابتلاء به آن هستند، مقاوم می کند.

از این سن به بعد هر ده سال یکبار واکسن دوگانه
بزرگسال (DT) باید تزریق گردد.