

آبسه پری آنال

آبسه پری آنال، یک عفونت موضعی در اطراف مقعد است که به دلیل انسداد و التهاب غدد مترشحه کانال مقعدی ایجاد می شود. این غدد مسئول ترشح موکوس و مرطوب نگه داشتن مخاط کانال مقعدی هستند. در واقع آبسه تجمعی از چرک است که به دلیل عفونت اولیه در غدد مذکور ایجاد شده و می تواند در زیر پوست اطراف مقعد و یا در بافت های عمقی گسترش یابد.

مهم ترین علامت آبسه پری آنال، درد اطراف مقعد و یا داخل آن است که طی چند روز شدید می شود و به صورت دردی طاقت فرسا درمی آید. این درد ممکن است با علایمی مانند: تب، لرز، تورم، قرمزی، درد موقع نشستن و خونریزی در هنگام دفع مدفوع همراه باشد.

تشخیص:

ساده ترین راه تشخیص آبسه مقعد، معاینه چشمی و بررسی سوابق و علایم بیمار است.

درمان:

درمان اصلی آبسه پری آنال، مراجعه به جراح و تخلیه آن است.

درمان طبی:

تا زمانی که تجمع چرک ایجاد نشده است، درمان طبی با آنتی بیوتیک های مناسب، مسکن و بی حس کننده های موضعی امکان پذیر است. ولی در صورت تشکیل آبسه، تنها درمان مؤثر جراحی خواهد بود.



فیستول مقعد:

فیستول، مسیری غیرطبیعی بین پوست اطراف مقعد و انتهای روده بزرگ است. انسداد غدد مترشحه، خراشیدگی، ضربه یا پارگی در طول کانال مقعد، رکتوم (انتهای روده بزرگ) و پوست اطراف پرینه و عفونت بعدی، از علل شایع آن به شمار می آیند. معمولاً فیستول ها به دنبال عفونت ظاهر می شوند و ممکن است در اثر آسیب، شقاق (فیشر)، یا التهاب ناحیه مورد نظر ایجاد شوند. امکان دارد که چرک یا مدفوع به طور مداوم از سوراخ پوست خارج شود. سایر نشانه ها شامل: دفع گاز یا مدفوع از طریق پیشابراه یا واژن است.



درمان جراحی:

فیستول ها خودبه خود بهبود نمی یابند و باید جراحی شوند. گاهی ممکن است قبل از عمل، به اقدامات تشخیصی بیشتری نیاز باشد، مانند: سونوگرافی داخل مقعدی یا MRI که بسته به صلاح دید پزشک انجام می شود. لازم به ذکر است که وجود فیستول می تواند باعث عود مکرر آبسه پری آنال شود.

آموزش مراقبت از خود در منزل:

- ۱- نحوه انجام پانسمان و شستشوی زخم را قبل از ترخیص، از پرستار بخش بیاموزید. وسایل لازم جهت انجام پانسمان در منزل، مانند: پدهای اطراف پرینه و شورت های مشبک (Surgifix) را تهیه کنید.
- ۲- عمل دفع را به موقع انجام دهید و از یبوست و زور



دانشگاه علوم پزشکی تهران
قطب جامع علمی طب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
(واحد آموزش سلامت)

آبسه پری آنال



بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:
آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، جنب
بیمارستان امام خمینی (ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان
وبسایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)

<http://chmc.tums.ac.ir>

عوارض درمان:

✓ عود بیماری.

حتماً بعد از جراحی، در زمانی که جهت ویزیت مجدد به
کودک شما اختصاص داده می‌شود، به درمانگاه جراحی
مراجعه بفرمایید.

زدن خودداری کنید.

۳- رعایت بهداشت، تمیز و خشک نگه داشتن ناحیه،
از پیدایش عفونت جلوگیری می‌کند. بعد از دفع
ادرار و مدفوع، در صورت آلوده شدن پانسمان، آن
را عوض کنید و پانسمان آلوده را در یک کیسه
نایلونی بیندازید، درب آن را ببندید و دست‌های
خود را بشویید.

۴- مسهل‌های نرم‌کننده مدفوع (طبق تجویز پزشک
معالج) و در صورت یبوست، همراه با رژیم
غذایی پرفیبر (الیاف، غلات، سبزیجات و
سبوس) به پیشگیری از یبوست کمک می‌کنند.

۵- ویزیت‌های مکرر را فراموش نکنید.

۶- توجه داشته باشید که فیستول‌های اطراف پرینه
طی ۴-۵ هفته و زخم‌های عمیق این ناحیه طی
۱۲-۱۶ هفته باید بهبود یابند

