

انواژیناسیون

انواژیناسیون حالتی است که در آن بخشی از روده کوچک، داخل قسمتی که جلو آن قرار گرفته است می‌لغزد. در مرحله بعد روده‌های درهم‌رفته دچار تورم می‌شوند و این دو با هم منجر به انسداد روده می‌گردند.



متعاقباً برای رفع این انسداد، روده‌ها دچار انقباض می‌شوند. کودک شیرخوار بر اثر شروع انقباضات، ناگهان گریه می‌کند و ممکن است دچار استفراغ، رنگ‌پریدگی و تب شود. اما در فاصله بین انقباضات، کاملاً سالم و آرام به‌نظر می‌رسد. اگرچه در چند ساعت اول، مدفوع او ظاهری طبیعی دارد، اما به‌تدریج به علت تورم جدار روده و فشار در آن ناحیه، مخاط خونریزی کرده و مخلوط خون و مخاط به‌صورت ژله قرمزرنگی دفع می‌شود. دلیل پیدایش انواژیناسیون معلوم نیست و می‌تواند در هر سن و سالی رخ دهد. اما اغلب اوقات در ۳ ماهگی تا ۳ سالگی دیده می‌شود.

(۱)

ابتدا چکار باید بکنیم؟

- اگر کودک شما مکرراً دچار حملات اسپاسمی می‌شود، داد و فریاد می‌کند و پاهایش را از شدت درد به شکم می‌چسباند، اما بین حملات کاملاً سالم به نظر می‌رسد، فوراً با پزشک مشورت کنید.
- مدفوع کودکان را از نظر مخاط و خون بررسی کنید.
- در بین حملات، دمای بدن کودک را از نظر تب اندازه‌گیری کنید.

آیا مشورت با دکتر لازم است؟

- اگر کودک شما در معرض حملات پی‌درپی شکمی و انقباض است و یا در مدفوع کودک متوجه خون و مخاط شدید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

علائم بیماری:

درد شدید شکم، احتمالاً همراه با جیغ و فریاد، استفراغ، رنگ‌پریدگی، تب مختصر، مدفوع حاوی خون و مخاط که شبیه ژله قرمزرنج است.

تشخیص بیماری:

بررسی‌های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش خون، عکس‌برداری اشعه ایکس از شکم و روده‌ها (با کمک تنقیه باریوم) باشد.

درمان:

(۲)

✓ معمولاً در رفتگی روده با کمک رادیولوژیست، با تنقیه رفع می‌شود. گاهی جراحی برای تصحیح این مشکل از طریق بیرون دادن قسمت فرورفته انجام می‌گیرد.

✓ معمولاً دارویی برای این اختلال مورد نیاز نیست، مگر اینکه عفونت بروز کند. در این صورت ممکن است آنتی‌بیوتیک تجویز شود.

✓ برای این بیماری، از درمان‌ها یا داروهای خانگی، مثل مسهل‌ها، استفاده نکنید. این داروها ممکن است خطرناک باشند.

✓ کودک باید تا زمانی که انسداد برطرف نشده است در تخت استراحت کند. پس از رفع انسداد، کودک می‌تواند تدریجاً فعالیت‌هایش را از سر بگیرد.



رژیم غذایی:


هیچگاه به کودکی که علائم انسداد روده دارد غذا ندهید. تا زمانی که انسداد برطرف نشده باشد، باید به کودک سرم داد. پس از بهبودی، رژیم خاصی مورد نیاز نیست.

(۳)



دانشگاه علوم پزشکی تهران
قطب جامع علمی طب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
(واحد آموزش سلامت)

انواژیناسیون



بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:
آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، جنب
بیمارستان امام خمینی (ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان
وبسایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)

<http://chmc.tums.ac.ir>



پیشگیری:

اگر علائم گفته شده ظاهر شدند، کودکان را به دقت تحت نظر بگیرید. با مراجعه به پزشک در همان مراحل اولیه، از بروز عوارض آن پیشگیری به عمل آورید. راه خاص دیگری برای پیشگیری وجود ندارد.

در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایید:

اگر کودک شما علائم انسداد روده را دارد، انسداد روده ناگهان از یک بیماری قابل معالجه به یک بیماری تهدیدکننده جان کودک تبدیل می شود.

آیا بیماری خطرناک است؟

انواژیناسیون اگرچه به ندرت اتفاق می افتد، اما یک بیماری خطرناک است و اگر درمان نشود می تواند کشنده باشد.



مراقبت های بعد از عمل جراحی:

- * کودک تا ۲۴ ساعت ناشتا باشد.
- * کودک مایعات سرد نخورد.
- * اگر کودک شیرخوار است، مادر بیمار غذاهای نفاخ نخورد و اگر کودک شیرخوار نیست، به خود کودک غذاهای نفاخ ندهید و به جای آن، غذاهای فیبردار مصرف کند.