


پدر و مادر گرامی: در این پمفت آموزشی به شما آموزش داده می‌شود در موقعی که کودک شما دچار حمله کبودی شده و بحال است تا رساندن او به مرکز نومانی، از چه کارهایی انجام دهید که حال او بدتر نشود.

تترالوژی فالوت


تترالوژی فالوت یک بیماری مادرزادی است که با چهار نقص قلبی شامل: تنگی شریان ریوی؛ سوراخ بین بطی؛ قرار گرفتن آئورت روی هر دو بطن راست و چپ؛ افزایش ضخامت بطن راست؛ همراه است.

قلب فرد مبتلا به تترالوژی فالوت



در شیرخواران زیر دو سال

شیرخواران مبتلا به تترالوژی فالوت ممکن است در بدو تولد سیانوز (کبودی) نداشته باشند، ولی به تدریج در چند ماه اول زندگی دچار کبودی شوند.



در کودکان بالای دو سال:

کودکان بزرگ‌تر با کبودی طول کشیده که تحت عمل جراحی قرار نگرفته‌اند، ممکن است دچار پوست تیره‌آبی، چشمان پُرخون و انگشتان چماقی باشند.



این مانورها مقاومت عروق سیستمیک را بالا برده و خون را به سمت بستر ریه برای تبادلات اکسیژن و گازهای خونی هدایت می‌کند:

- چمباتمه زدن
- نشستن روی ساق پا (مشابه چمباتمه زدن)
- قیچی کردن پاها هنگام ایستادن
- جمع کردن پای شیرخوار روی شکم
- دراز کشیدن



حملات کبودی با کاهش جریان خون ریوی همراه است که با طولانی شدن آن، منجر به کاهش شدید اکسیژن خون می‌شود. شیرخوارانی که در حالت استراحت، کبودی خفیف دارند، ممکن است بیشتر مستعد ابتلاء به حمله کبودی باشند.



کودکان نوپا یا بزرگ‌تر ممکن است به طور غریزی در زمان تنگی نفس خم شوند. آرام کردن و انجام مانورهای زیر می‌تواند پیشرفت حمله را متوقف کند.



دانشگاه علوم پزشکی تهران
قطب جامع علمی طب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
(واحد آموزش سلامت)

تترالوژی فالوت



حملات اغلب، صبح هنگام بیدار شدن، یا بعد از گریه شدید اتفاق می‌افتد.



شیرخوار تنفس‌های عمیق پیدا می‌کند، بیقرار شده، کبودی افزایش یافته، نفس‌ها بریده بریده می‌شود و به دنبال آن شیرخوار از هوش می‌رود.

حمله افزایش ناگهانی کبودی (Tet spell)

کودکانی که تحت جراحی قرار نگرفته‌اند، هنگام فعالیت دچار تنگی نفس می‌شوند. ممکن است برای مدت کوتاهی فعالانه بازی کنند و سپس بنشینند یا دراز بکشند. این کودکان معمولاً بعد از چند دقیقه چمباتمه زدن، می‌توانند فعالیت بدنی را از سر گیرند.



گاه‌ها، شیرخوارانی که دارای تترالوژی فالوت هستند، ناگهان پوست، ناخن و لب‌هایشان بعد از گریه، تغذیه، یا زمانی که تحریک می‌شوند به‌طور ناگهانی کبودتر می‌شود. حملات کبودی ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت به‌طول انجامد. حملات کوتاه با ضعف عمومی و خواب همراه است. حملات شدید ممکن است به سمت بیهوشی و گاه تشنجه یا ضعف یک‌طرفه بدن منجر شود. حمله کبودی در شیرخواران کمتر از یک سال شایع است. شروع آن معمولاً خود به‌خودی و غیرقابل پیش‌بینی است.

بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:
آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیلابان دکتر محمد قربی، جنب بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان
وبسایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)
<http://chmc.tums.ac.ir>.