

محل ختنه را با آب خالی بشویید. تا زمانی که آلت کودک بهبود نیافته از به کار بردن صابون، لوسیون، پودر و دستمال مرطوب اجتناب کنید. این کار را به آرامی انجام دهید چون ممکن است دردناک باشد.

● در طی ۳ تا ۴ روز اول بعد از ختنه، واژلین یا پماد آنتی میکروبیال یا پماد تتراسیکلین بر روی آلت بمالید. این کار را به آرامی انجام دهید چون ممکن است دردناک باشد.



● در هر بار تعویض پوشک بچه می‌توانید روی پوشک در قسمتی که مجاور آلت قرار می‌گیرد واژلین یا پماد ویتامین آ (A) و ویتامین د (D) بمالید.



آمار نشان داده است که عفونت ادراری در پسر بچه‌های ختنه نشده به مراتب بیشتر از پسرهای ختنه شده است. بنابراین، ختنه می‌تواند در مواردی، از پیدایش عفونت دستگاه ادراری جلوگیری کند.



مراقبت بعد از عمل ختنه:

چیزهایی که به آن نیاز دارید:

* ترمومتر (تب‌سنجد)

* پماد آنتی میکروبیال، مثل تتراسیکلین یا جنتامایسین.
● کودک را حداقل به مدت یک هفته، یا تا زمانی که پوست بهبود یابد در وان حمام قرار ندهید.



ختنه:
ختنه، عمل جراحی برداشتن پرپوس است. پرپوس، پوستی است که قسمت انتهایی آلت تناسلی کودک پسر را می‌پوشاند.



دلایل ختنه کردن:

به طور طبیعی در زیر پوستی که آلت تناسلی کودک را می‌پوشاند، دائمًا ماده سفید رنگی ترشح می‌شود. البته این ماده، چرک (عفونت) نیست و خاصیت نرم کنندگی داشته و مانع چسبیدن پوست به سر آلت می‌گردد. در بعضی از مواقع این ترشحات عفونی شده و پوست سر آلت نیز دچار عفونت می‌گردد. در موارد عفونت، مخصوصاً در نوزادان و شیرخواران موجب عفونت ادراری می‌شود.





88

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 قطب جامع علمی طب کودکان
 بیمارستان مرکز طبی کودکان
 (واحد آموزش سلامت)

ختنه



والدین عزیز باید در مورد احتمال ضعیف شدن جریان ادرار در طی ۲ سال اول به علت تنگی نوک مجرای ادرار آگاه باشید.



- اگر خونریزی رخ داد، فشردن محل خونریزی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه معمولاً سبب توقف خونریزی می‌گردد. در صورت ادامه خونریزی، آلت را با دست فشار دهید و در همین حالت به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

- کودک شما طرف مدت ۶ ساعت پس از ختنه معمولاً ادرار می‌کند.

در صورتی که هر کدام از موارد زیر اتفاق افتاد با پزشک تماس بگیرید:

- ◀ افزایش خونریزی یا ترشح از آلت
- ◀ کودک به طور طبیعی طی ۶ تا ۸ ساعت ادرار نکند.
- ◀ تغییر رنگ سر آلت به رنگ آبی یا سیاه
- ◀ درجه حرارت کودک بیش از ۳۸ درجه باشد.
- ◀ ظاهر ناخوش کودک
- ◀ بوی نامطبوع یا ترشح زرد رنگ از سر آلت
- ◀ هرگونه تورم یا قرمزی در اطراف نوک آلت که بدتر شود.

بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:
 آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیلابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان
 وبسایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)
<http://chmc.tums.ac.ir>