

عوامل مستعد شدن نوزاد به عفونت ادراری:

- کوتاه بودن مجرای ادرار و نزدیک بودن معقد به مجرای ادرار
- پس زدن ادرار از مثانه به حالت و کلیه ها
- ختنه نشدن پسرها



تشخیص:

- با آزمایش کامل و کشت ادرار می توان به تشخیص عفونت ادراری رسید.
- در صورت اثبات عفونت های ادراری، بررسی های تکمیلی شامل:

 - سونوگرافی
 - در پسرها ختنه کردن
 - عکس رنگی و سایر مطالعات تشخیصی طبق نظر پزشک
 - مثبت شدن کشت ادرار از نظر باکتری

باید توجه داشت که نحوه جمع آوری ادرار، تمیز و با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.




علایم و نشانه ها:

- اختلال در رشد و مشکلات تغذیه ای، کاهش وزن
- تب
- بیقراری، اتساع شکم
- اسهال، استفراغ، ادرار بد بو
- زردی که طول کشیده باشد.

علایم واضح و روشن عفونت ادراری در کودکان بالای ۲ سال دیده می شود که شامل:

- * شب ادراری و بی اختیاری در طول روز
- * تکرار تب
- * ادرار با بوی متعفن
- * سخت ادرار کردن
- * درد پهلوها

شیوع عفونت ادراری در نوزادان نارس و با وزن تولد پایین، بسیار بالاتر است.



عفونت ادراری در نوزادان:

عفونت ادراری، بیماری ای است که در اثر وارد شدن میکروب به مجرای ادراری ایجاد می شود. معمولاً علت عفونت ادراری در نوزادان و کودکان میکروب ها هستند که به علت نزدیک بودن معقد به مجرای ادراری ایجاد می شود.

ولی در دوران نوزادی، راه ورود میکروب به دستگاه ادراری بیشتر از طریق خون است.

عفونت ادراری یک بیماری مهم و شایع است که می بایست به موقع تشخیص داده شده و به طور قاطع درمان شود. پیگیری های لازم نیز جهت تشخیص انجام گیرد. در صورت تدا이بر درمانی مناسب، در اکثر موارد، عفونت به خوبی کنترل شده و مشکل خاصی پیش نمی آید.

در دوران نوزادی، عفونت ادراری در جنس پسر شایع تر است.



دانشگاه علوم پزشکی تهران
قطب جامع علمی طب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
(واحد آموزش سلامت دفتر پرستاری)

عفونت ادراری در نوزادان



توجهات خاص مادر:

- ✓ تقلا و بیقراری پیش از ادرار کردن و هنگام آن، دلیل بر عفونت ادراری است.
- ✓ تحریک‌پذیری و جیغ‌های دوره‌ای هنگام ادرار کردن و سوزش ادرار و رنگ و مقدار ادرار را مد نظر داشته باشید.
- ✓ از آنجا که محیط مرطوب، زمینه رشد میکروب‌ها را فراهم می‌کند، لذا پوشک نوزاد در صورت خیس شدن باید سریع عوض شود.



درمان:

نوع درمان و طول درمان را پزشک براساس تشخیص عفونت ادراری مشخص می‌کند. در نوزادان با عالیم عفونت ادراری باید چند روز در بیمارستان جهت تکمیل اقدامات درمانی و تشخیصی بستری باشد.



معمولًا نوزادان نیاز به ۱۰ - ۱۴ روز درمان با آنتی‌بیوتیک دارند.

ضروری است که کشت ادرار ۷ تا ۴ روز پس از قطع درمان تکرار شود.

بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:
آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیلابان دکتر محمد قربی، جنب بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲ مرکز طبی کودکان
وبسایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)
<http://chmc.tums.ac.ir>.