



مراقبت:

همانطور که ذکر شد، ممکن است کودک مختصراً بیقراری کند. علت این است که شاید سنگینی گچ زیاد باشد که تا خشک شدن کامل گچ ادامه دارد. بهتر است زیر پای کودک در زیر زانو حوله کوچکی را تا کرده و قرار دهید تا پاشنه گچ روی زمین قرار نگیرد. حوله شما باید نخی باشد. از گذاشتن اجسام پلاستیکی زیر گچ خودداری نمایید، زیرا از تبادل حرارتی گچ با هوا جلوگیری کرده و می‌تواند سبب سوختگی پوست شود.

کنترل گردش خون اندام در گچ مهم است. به رنگ انگشتان اندام در گچ دقیق نگذارد، رنگ انگشتان باید معمولی (غلب صورتی) باشد و نباید کبود یا خیلی رنگ پریده شود. اگر روی ناخن انگشتان پای گچ گیری شده را فشار دهید، رنگ

- حتماً نواحی بالای گچ را کاملاً خشک کنید. در صورت عدم انجام این کار، زخم‌های ناشی از گچ در آن مناطق رخ می‌دهد.
- مواطن باشید قسمت‌های بالای گچ، به مدفوع یا ادرار آلوده نشود، زیرا می‌تواند سبب زخم شدن پوست آن ناحیه و عفونت شود.



استحمام کودکی که پای او در گچ است:

بهترین راه این است که فقط تنه و دست‌های او را با یک اسفنج مرطوب تمیز کرده و سپس با حوله خشک کنید و تا حد امکان از استحمام کودک خودداری کنید. در زمان حمام دادن کودک، دقت کنید گچ و پینه زیر آن خیس نشود. استحمام کودک در صبح روزی که قرار است جهت باز نمودن گچ، به اتاق عمل برود، اشکالی ندارد.



امید است والدین گرامی با رعایت آموزش‌های ذکر شده، به حداکثر بهبودی و سلامت کودک ان خود، دست یافته و از عوارض احتمالی لید نفع درمان پیشگیری نمایند.



اصول نگهداری پا در گچ:

- مهم‌ترین نکته در اندام گچ گیری شده این است که در صورت وجود هرگونه نگرانی نسبت به گچ، بلا فاصله با پزشک مراجعت تماس بگیرید.
- لازم به ذکر است، باز کردن گچ پا، در اتاق عمل و توسط پزشک انجام می‌شود.
- اگرچه گچ گیری برای کودک درد ایجاد نمی‌کند، اما دادن مقداری شیر در حین گچ گیری و در آغوش گرفتن آن، به کودک کمک می‌کند تا بهتر بتواند آن شرایط را تحمل کند.
- به هیچ وجه در مواردی که پوشک کودک را تعویض می‌کنید، اجازه ندهید گچ مرطوب شود.



دانشگاه علوم پزشکی تهران
قطب جامع علمی طب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
(واحد آموزش سلامت)

مراقبت‌های بعد از گچ‌گیری



بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:
آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان
وبسایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)
<http://chmc.tums.ac.ir>.

براشتن گچ:

- ◀ پس از برداشتن گچ، فعالیتهای عضو را به تدریج شروع کنید، چون عضوی که برای مدتی در گچ بوده، سفت و ضعیف شده است.
- ◀ در صورت وجود ورم، عضو را بالاتر از سطح قلب قرار دهید.
- ◀ به دلیل وجود سلول‌های پوستی مرده، پوست آن ناحیه خشک و پوسته پوسته شده و سریعاً زخم می‌شود. پس آن را نخارانید، فقط پوست را به آرامی شسته و با محلول‌های نرم‌کننده مرتبط کنید.

ناخن انگشت سفید شده و بلا فاصله با برداشتن فشار، به رنگ صورتی اولیه بر می‌گردد.

در صورت هرگونه اختلال در گردش خون امکان سفت بودن گچ مطرح است و باید به پزشک اطلاع داده شود.

خشک شدن گچ:

محکم شدن قالب گچ ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد، اما اگر کاملاً خشک نشود، استحکام لازم را ندارد. خشک شدن کامل ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان لازم دارد. در این مدت می‌توان از پنکه جهت خشک شدن سریع‌تر گچ استفاده کرد.

مراقب باشید گچ مرتبط روی سطوح خیلی سفت یا لبه‌های تیز قرار نگیرد.

پوست ناحیه تماس با لبه گچ را روزانه از نظر زخم بررسی کرده و با انگشت ماساژ دهید.

احساس حبس شدن در فضای تنگ و بسته باعث اضطراب کودک می‌شود و حمایت نزدیکان می‌تواند به او آرامش دهد.

گچ‌هایی که بخش‌هایی از تنہ و شکم را هم می‌گیرد، ممکن است باعث کند شدن حرکات گوارشی، تهوع و استفراغ شود که باید به پزشک اطلاع دهید.