



## پیس میکر در چه مواردی استفاده می شود؟


- ◀ بلوک کامل قلب.
- ◀ برای بیمارانی که دچار ایست قلبی شده‌اند.
- ◀ بیمارانی که در معرض ایست قلبی قرار دارند.
- ◀ بیمارانی که به دارو جواب نمی‌دهند و نمی‌توان از روش‌های طبی یا جراحی استفاده نمود.
- ◀ در برخی از بیمارانی که دچار ضعف شدید ماهیچه شده‌اند (کاردیومیوپاتی).



## عارض پیس میکر:

- **عفونت:** در محل ورود کاتتر پیس، ممکن است عفونت موضعی ایجاد شود.
- اختلال ریتم قلب در نتیجه عملکرد نادرست. برای اطمینان از کارکرد درست دستگاه پیس میکر، باید مراجعة منظم به پزشک انجام شود.

**پیس میکر دائمی:**  
 "پیس" دائم را در طرف چپ قفسه سینه، زیر استخوان ترقوه قرار می‌دهند. پیس میکر در اتاق عمل و با بی‌حسی موضعی صورت می‌گیرد، بدین ترتیب که ضربان‌ساز و سیم را از طریق وریدهای بزرگ به داخل بطن راست هدایت می‌کنند. بعد از کارگذاری، عکس قفسه سینه گرفته می‌شود تا از محل صحیح سیم‌ها اطمینان حاصل شود.



## دستگاه پیس میکر چگونه کار می‌کند؟

الکترودها (سیم‌ها) به دو عامل واکنش نشان می‌دهند:

۱- سرعت ضربان قلب

۲- تغییر فواصل الکتریکی نوار قلب


این دستگاه ۵-۱۰ ثانیه بعد از حس تغییرات ضربان قلب، شوک الکتریکی لازم را جهت برگرداندن ریتم طبیعی تولید می‌کند.

## پیس میکر قلبی چیست؟

دستگاه تولیدکننده ضربان قلب است. اگر قلب فردی، به هر دلیلی کمتر از حد طبیعی یا نامنظم کار کند، یا اشکال هدایت ضربان طبیعی در قلب وجود داشته باشد، یکی از راههای کمک رساندن، گذاشتن دستگاه ضربان‌ساز مصنوعی است. پیس میکرها به طور موقت، یا دائم در حفرات قلب گذاشته می‌شود.

## پیس میکر موقت:

در نوع موقت، این دستگاه بیرون از بدن بیمار قرار می‌گیرد. سیم الکترودهای آن از درون بدن به قلب فرستاده می‌شود. طول مدت زمانی که بیمار می‌تواند به طور موقت "پیس" شود حدود دو هفته است و اگر چنانچه نیاز به ادامه "پیس" باشد باید نوع دائم آن را جایگزین نوع موقت نمود.



## مراقبت از زخم بعد از گذاشتن پیس میکر:

- ✓ زخم، روزانه بررسی شود و بروز هر نوع التهاب، قرمزی، ترشح، خونمردگی، و تب به پزشک گزارش شود.
- ✓ از پوشیدن لباس های تنگ که باعث ایجاد فشار روی زخم می گردد، اجتناب شود.
- ✓ از دستکاری محل کاشت "پیس" جدأ خودداری کنید.
- ✓ حدود هفت روز بعد، بخیه باید کشیده شود.

## نکاتی که بعد از ترخیص باید به آنها توجه کرد:

- \* توصیه می شود روزانه به مدت یک دقیقه کامل نبض کودک خود را شمارش کنید و هرگونه کاهش یا افزایش ناگهانی در سرعت آن را گزارش نمایید.
- \* در صورت وجود درد، قرمزی یا تورم و ترشح در محل برش، به پزشک کودک خود مراجعه کنید.
- \* از وارد آوردن فشار روی محل ضربان ساز بپرهیزید و به کودک لباس آزاد بپوشانید.
- \* از حرکات شدید بازو و شانه ها پس از گذاشتن پیس میکر شدیداً خودداری کنید (در صورتی که پیس میکر نزدیک شانه ها کار گذاشته شده باشد).
- \* حفظ فاصله بی خطر (۱۵۰ سانتیمتر) از مایکرو وبو.
- \* کارت شناسایی به همراه کودک باشد.
- \* از قرار گرفتن کودک در محیط های با ولتاژ بالا

نظیر دکل های برق و یا خطوط فشار قوی  
بپرهیزید.

\* به هنگام مسافرت هوایی، کارت مشخصات کودک خود را به مأمورین کنترل نشان دهید. زیرا فلزیاب وجود ضربان ساز را سریعاً شناسایی می کند. همچین در بعضی فروشگاه ها به منظور جلوگیری از دزدی که مجهز به سیستم ردیاب فلزی در محل ورود و خروج می باشند، باید به نگهبانان اطلاع دهید که کودکتان پیس میکر دارد.

\* قبل از انجام تست های تشخیصی مخصوصاً "ام.آر.ای" با پزشک مشورت کنید.

\* در صورتی که پیس میکر در شکم کار گذاشته شده باشد، کودک از خواهدیدن روی شکم و سینه خودداری نماید. منظور حرکات معمول در زمان خواب نمی باشد.

\* بعد از کشیدن بخیه ها می توانید کودک را حمام کنید.

## علایم اختلال عملکرد پیس میکر:


مشکل تنفسی، سرگیجه، حالت غش، خستگی، کسالت، سکسکه، افزایش و یا کاهش وزن.

در صورت بروز این علایم، ابتدا نبض کودک خود را بشمارید و بعد به پزشک اطلاع دهید.



دانشگاه علوم پزشکی تهران  
قطب جامع علمی طب کودکان  
بیمارستان مرکز طبی کودکان  
( واحد آموزش سلامت )

## پیس میکر قلب



بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی مرکز طبی کودکان:  
آدرس: تهران، انتهاي بلوار کشاورز، خیلابان دکتر محمد قریب، جنب  
بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲ مرکز طبی کودکان  
وب سایت بیمارستان: (آموزش به بیمار)  
<http://chmc.tums.ac.ir>